

Kasuistischer Beitrag zum Sarcoid Boeck

(Miliarlupoid Boeck)



Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen

Vorgelegt von

Josef Forster, pr. Arzt aus Vilsbiburg (Nby.)

Tag der mündlichen Prüfung:

5. Juli 1926



1928

Altbayerische Verlagsanstalt A.-G.
Burghausen

Referent: Prof. DR. HAUCK

Dekan: Prof. DR. REINMÖLLER

Meinem sehr verehrten Gönner Herrn Univers.Prof.

DR. J. HELL, ERLANGEN,

ergebenst zugeeignet

Dem Andenken
meines teuren verstorbenen Vaters und
meiner lieben Mutter
aus Dankbarkeit gewidmet





Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA40154019_0158

A.) Allgemeines über TUBERKULIDE.

Unter dem Namen Tuberculide fasst man eine Reihe von Erkrankungsformen der Haut zusammen, deren Zusammenhang mit der Tuberculose als höchst wahrscheinlich angenommen wird. Sie sind sehr oft die Begleiterscheinungen anderweitig lokalisierter Tuberculose (Drüsen, Knochen, Haut). Von echten Hauttuberculosen unterscheiden sie sich durch gewisse, charakteristische Hauptmerkmale, wie Benignität, disseminiertes, schubweises Auftreten, u. zwar sehr gerne in symetrischer Anordnung, Neigung zu spontaner, spurloser oder atrophischer Verheilung, nicht ausgesprochen tuberculöse Structur, meist fehlenden Bacillennachweis u. sehr häufig negative Ergebnisse der Impfversuche.

Diese eigentümlichen Merkmale haben zu der Hypothese Anlass gegeben, dass es sich bei diesen Hautaffectionen um eine Fernwirkung der Tubercelbacillen durch ihre Toxine handle. Andere Autoren traten für die Anschauung ein, dass die Tuberculide das Product einer echten, bacillären Infection mit abgeschwächtem oder totem Bacillenmaterial seien. Man kann hiefür die Tatsache geltend machen, dass eine Anzahl, bis vor kurzem noch zu den Tuberculiden gerechneter Hautkrankheiten heute in der Reihe der wirklichen Hauttuberculosen genannt wird, so: Lichen scrophulosorum, Acne teleangiectodes u. in letzter Zeit auch das Erythema induratum (Bazin). Wenn gerade bei diesem letzteren in der Mehrzahl der Fälle auch keine Tubercelbacillen gefunden wurden, u. der Tierversuch negativ ausfiel, so wurde doch vereinzelt in Serienschnitten der Bacillennachweis erbracht u. Meerschweinchen-Impfungen ergaben positives Resultat. Das histologische Bild des Erythema induratum zeigt Riesenzellen, lymphocytäre Infiltration u. Epitheloidzellen wie das einer echten Hauttuberculose, jedoch sind zentrale Necroseherde selten.

Die neuesten Anschauungen über die Tuberculide sehen deren Ätiologie in einer Allergie der Haut, welche bei einem Tuberculösen auf die (meist hämatogen erfolgende) Invasion mit Tubercelbacillen ganz anders reagieren kann wie die eines gesunden Menschen u.

zur Bildung bacillenarmer-oder-freier Krankheitsherde führt. In diesen entgehen die Tubercelbacillen bei ihrer geringen Anzahl der microscopischen Musterung oder sie zerfallen bald.

Dass die Zugehörigkeit mancher Hauterkrankungen zu den Tuberculiden vielfach umstritten ist, ist leicht erklärlich. Denn bei der ausserordentlichen Vielgestaltigkeit, in der tuberculöse Hautaffecte erwiesenermassen auftreten können, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Kreis der echten Hauttuberculosen noch mancherlei Zuwachs aus der Reihe der Tuberculide erfährt. Als sicher zu den Tuberculiden dürften z. Zt. folgende zu rechnen sein: die Dermatitis nodularis necrotica, die Folliclis u. Acnitis, zusammengefasst unter dem Namen: papulo-necrotische; ferner die Acne cachecticorum. Auch waren bisher in dieser Gruppe aufgeführt: der Lupus pernio und die sogenannten SARCOIDE. Diese letzteren weisen wiederum 2 Unterarten auf: die subcutanen (Darier-Rouzy) u. die cutanen (Boeck). Doch ist ihre Zugehörigkeit hieher heute vielfach umstritten. Zieler z. B. rechnet das Sarcoid Boeck (im folgenden mit »S. B.« bezeichnet) sowie Lupus pernio, welche er identifiziert, nicht mehr zu den Tuberculiden.

Von dem Miliarlupoid Boeck soll nun im Folgenden die Rede sein.

B.) Das BOECKSCHE SARCOID.

(Ein specieller Fall u. Allgemeines).

Im Vergleich zu den subcutanen Sarcoiden *DARIEN-ROUZY* verdient weit mehr das cutane S. B., es als selbstständigen Krankheitstyp anzuführen; denn es hat in klinischer Hinsicht einen viel ausgeprägteren Eigencharacter als erstere. Dazu ist es als eine ganz seltene Hautaffection zu bezeichnen, die sogar in einer Klinik mit reichlichem Hautmaterial möglicherweise jahrelang durch keinen Fall vertreten sein kann. Wegen dieses seltenen Vorkommens bietet fast jeder einzelne Casus genügend Anlass, ihn zu veröffentlichen, wenn nicht schon aus dem Grunde, um aus dem reichen literarischen Material mehr als bisher noch die Ätiologie u. überhaupt das Wesen dieser Krankheit zu klären. Darum sei zuerst über einen Fall mit S. B. aus dem Ambulatorium der Universitätshautklinik Erlangen (Vorstand: Prof. Dr. L. Hauck) berichtet.

Krankengeschichte.

Patient J. B., 40 Jahre alt, verheiratet.

Vorgeschichte: Eltern angeblich nie krank gewesen. Vater innerhalb 3 Tagen gestorben (Krankheit unbekannt, da Pat. in dieser Zeit an der Front), Mutter an Ascites gestorben. Geschwister: ein Bruder lebt, gesund. Frau u. 2 Kinder (6 u. 8 Jahre) gesund.

Frühere Krankheiten: nie ernstlich krank gewesen; während des Krieges (16. Nov. 16.—7. Juli. 17.) im Lazarett wegen Nephritis, aber seitdem keinerlei Beschwerden von Seiten der Nieren. Potus u. Infectio venerea negatur.

Besondere Anamnese: Ungefähr im Frühjahr 1924 bemerkte Pat. am lk., äusseren Augenwinkel eine ca. erbsengrosse, rötliche Pflaume, die bald ins Bläulich-rote überging. Nach 3—4 Wochen verschwand sie wieder, ohne bis dahin grösser geworden zu sein. Ein Jahr später an der gleichen Stelle dieselbe Erscheinung; diesmal aber in der Grösse eines 2-Pf. Stückes, von hellroter Farbe. Auch diese Efflorescenz verging wieder. Dieser Vorgang spielte sich noch 3—4 mal in der gleichen Weise ab, bis zuletzt vor annähernd dem Jahre die Efflorescenz erneut auftrat, auch wieder 2 Pf.-stückgross, dann aber sehr rasch zunahm bis zu der Grösse, wie sie im Localbefund beschrieben. Dieser Hautaffect heilte August 1925 ohne Hinterlassung irgend einer Spur. Weitere 3 Wochen nach dieser Abheilung (Mitte Sept. 25.) trat an derselben Stelle sowie am rechten äusseren Augenwinkel (Localbefund 1) die gleiche Erscheinung wieder auf, diesmal wieder in der gegenwärtigen Grösse, am 8—10 Tage später unter dem Einfluss specialärztlicher Behandlung wieder in den früheren Stadien sich ganz zurückzubilden.

Ende Nov. 25. erschien auf der lk. Wange die gleiche Efflorescenz unter dem lk. äusseren Augenwinkel, die noch vor Weihnachten 25 verschwand (Pigmentrest). An Weihnachten 1925 derselbe Vorgang unter dem lk. Ohre (Localbefund 4). Seit 14 Tagen bestehen, ist gleichzeitig auftauchend, die Hautaffectionen am rechten äusseren Augenwinkel u. R. Wange. Ein paar Tage darauf kam die Krankheitserscheinung am lk. äusseren Augenwinkel zum Ausbruch und vor etwa 8 Tagen die Knötchen unter dem linken Kieferbogen. Mit Ausnahme eines vereinzelt Falles hatte Pat. nie irgendwelche subjectiven Beschwerden, wie Jucken u. s. w.

Befund: 40-jähriger, kräftig gebauter Mann in gutem Ernährungszustand. Sichtbare Schleimhäute gut durchblutet, leicht arterielle Verfärbung der Cornea.

Gesicht: s. Localbefund!

Hals u. Rachen: o. B.; keine Drüsenschwellungen.

Herz: normale Grenzen. Töne rein. Action kräftig. Puls: regelmässig, voll, 64.

Lungen: gute Verschieblichkeit der hint. unt. Grenzen; leichte Emphysem-Form des Thorax. Ueberall reines Vesiculäratmen.

Abdomen: o. B.

Nervensystem: o. B.

Harn- u. Geschlechtsorgane: o. B.

Urinbefund: E: —; Z: —; Sedimente: einige Leucocyten, vereinzelt Erythrocyten.

Extremitäten: o. B.; keine Narben, keine Hautaffectionen.

Blutbild: Hb. 95 %

Erythrocyten 3 700 000

Leucocyten 5 800

Poly	71 ‰
Lympho	24 ‰
Eos.	3 ‰
Ueberg.	1 ‰
Mastz.	1 ‰

Localbefund 1: Auf der R, Geschichte 2 scheibenförmig Herde; der eine 2 cm seitwärts vom äusseren Orbicularwinkel von ziemlich ovaler Form u. mit einem Längsdurchmesser von 4 u. einem Breitendurchmesser von ca. 2,5 cm. Der untere Herd befindet sich 2 cm unterhalb des r. Auges, die Form ist mehr rundlich, die Masse sind hier 2:3 cm. Die Herde sind nicht scharf begrenzt, von lebhaft braunrötlichem Farbton; sie überragen leicht das umgebende Hautniveau; die Haut ist deutlich infiltriert u. von weichteiger Consistenz. Bei Druck mit dem Glasspatel bleibt bei vollständiger Anämisierung des Gewebes eine ausgesprochen gelblich-bräunliche Verfärbung zurück, die genau denselben Farbenton aufweist wie bei Lupusknötchen, jedoch mit dem Unterschiede, dass keine deutlich umschriebene Knötchenbildung sichtbar ist, sondern mehr eine diffuse, staubwolkenartige Farbenverteilung.

Neben den bisher beschriebenen Hauptveränderungen fällt an den Krankheitsherden noch auf eine reichliche Anordnung feinsten Teleangiectasien. Schuppung an den Efflorescenzen ist nicht vorhanden; doch tritt bei leichtem Kratzen mit dem Fingernagel feinste, kleinste Schuppung zu Tage. Bei der Infiltration handelt es sich um eine rein cutane; denn die verdickten Hautpartieen lassen sich gut über der Unterlage verschieben. Bei dem Herde unterhalb des r. Auges findet man dazu noch neben dem unscharf umschriebenen Rande in der Peripherie vereinzelt, kleine, etwa stecknadelkopfgrosse Knötchen.

2. Direct neben den lk. äusseren Augenwinkel, nach dem Ohre zu, zeigt sich ein weiterer Krankheitsherd von annähernd rundlichem Aussehen u. einem Durchmesser von ca. 3 cm, ebenfalls unscharf begrenzt u. von derselben Farbe wie die oben beschriebenen, doch ist die Farbe etwas blasser als die der erwähnten, aber auch von braunrötlicher Färbung. Die Hautinfiltration dieser Efflorescenz tritt noch deutlicher als an den vorigen hervor u. zwar besonders an den Randpartieen, während das Zentrum viel flacher ist. Das Infiltrat scheint hier in Rückbildung begriffen zu sein. Auch hier wieder feinste, kleienförmige Abschuppung beim Kratzen mit dem Fingernagel.

3. Ein 4. Herd mit etwas ovalem Aussehen zeigt sich hinter dem lk. Ohre. Hier ist die erkrankte Hautpartie ziemlich scharf abgegrenzt gegen die gesunde; ein etwa 0,3—0,5 cm breiter Rand zeichnet sich deutlich, wallartig erhaben, von dem eingesunkenen, flachen zentralen Teil ab. An dieser Stelle fällt schon ohne Kratzen mit dem Fingernagel feinste, kleinste Schuppung auf. Die Farbe

dieser Stelle ist blasser als an den übrigen Herden; die übrigen Merkmale sind dieselben.

4. Unterhalb des lk. Ohres, entlang des Unterkieferrandes, den man noch 6, etwa linsengrosse Knötchen eingestreut von zäsig derber Consistenz, rotbrauner Färbung u. ganz feiner, geringer Abschuppung auf der Kuppe. Bei Druck mit dem Glasspatel bleibt auch hier nach der Anämisierung des Gewebes die gelbbraune, diffus verstreute Färbung zurück.

5. Ein einzelnes, kleines Knötchen findet sich auf der lk. Innenseite oberhalb des unter 3 beschriebenen Herdes.

6. Unterhalb des Hautaffectes am lk. äusseren Augenwinkel stellt eine stark braune Pigmentierung auf mit noch gering fühlbarer Infiltration, ohne dass aber ein Krankheitsherd deutlich sichtbar wäre. Dagegen findet sich an dieser Stelle eine sehr stark und deutlich ausgeprägte, eingelagerte, diffus verstreute Gelbbraunfärbung auf Druck mit dem Glasspatel. Eine atrophische Stelle ist nirgends zu finden. Drüenschwellungen wurden nirgends festgestellt.

Histologie: Das microscopische Bild ergab folgenden Befund: Scharf umschriebene Herde meist epitheloider Zellen in der Subcutis, bes. aber auch in der Cutis gelegen. An anderen Stellen der Präparate fanden sich mehr strangförmige oder diffuse Infiltrate polymorpher Zellen, in welchen Lymphocyten, Mast- u. Plasmazellen sehr spärlich vorhanden sind. Die Infiltrate sind meist deutlich um Gefässe gelagert. Gefässe wenig verändert, etwas erweitert, keine Intimawucherung.

Nachtrag vom 15. 5. 26.: Pat. kommt heute wieder zur Entfernung der Fäden. Excisionsstelle: Wunde per primam geheilt. Es fällt auf, dass der Erkrankungsherd, aus dem in der oberen Partie excidiert wurde, nur noch ganz minimal infiltriert ist und das Colorit sich nur noch durch eine ganz leichte Braunrotfärbung von der Umgebung unterscheidet. Die Herde unter u. hinter dem l. Ohr sind nicht mehr zu sehen. Unter dem r. Auge ist der Krankheitsprocess wesentlich weicher u. blasser geworden u. zeigt jetzt keine Schuppenbildung mehr. Am wenigsten Rückbildung zeigt der Process über dem r. Jochbogen; doch ist auch hier bedeutendes zurückgezogen sein der Infiltration u. ein Abblassen des Hautcolorits festzustellen. In den unteren Partien dieses Krankheitsherdes ist noch deutliche Schuppenauflagerung zu sehen. Durch die nach oben einsetzende Rückbildung hat der zuletzt beschriebene Krankheitsherd etwa Nierenform angenommen.

14. 6. 26.: Bei der heutigen Vorstellung des Kranken werden mehrere neue Herde in der Gegend des lk. inneren Augenwinkels, unter dem r. Auge u. vor allem ein 1-Pf. stück. grosser Herd in der Gegend der Lendenwirbelsäule festgestellt. Ueberall deutliche gelbliche Einlagerungen auf Spateldruck u. deutliche Prominenz der Floreszenzen.

Therapie: Röntgenbestrahlung des Herdes ausserhalb des r. Auges. Arsen in Tropfen.

Nachtrag vom 28. 6. 26.: Auf der r. Wange 3 Herde von etwa 3 *M*-stück-Grösse, von denen die oberen zwei ineinander übergehen u. confluieren. Das Aussehen unterscheidet sich sonst nicht von dem früher beschriebenen Befund. Auch hinter u. unterhalb des r. Ohres einzelne kleine, linsengrosse Knötchen. Eine etwa 1-*M* stück-grosse Stelle in der lk. Occipitalgegend. Alle Stellen tragen den Character des cutanen Infiltrates. Am Rücken ist die Hautaffection verschwunden.

Tierversuch: Die Section des am 8. Mai mit einer aus einer erkrankten Hautstelle exidierten Gewebstück implantierten Meerschweinchens ergab am 24. 6. 26. folgendes Bild: An der der Implantation entsprechenden Stelle findet sich ein klein-kirschkerngrosser, gelblicher, weicher Körper, der macroskopisch fettähnlich aussieht.

Microskopisch lassen sich im Schnitt noch Reste des seinerzeit implantierten Gewebematerials in Form von umschriebenen Infiltrat-herden mit nicht sehr dichter Zellanordnung, die im wesentlichen aus Rundzellen bestehen, nachweisen. Die Herde sind schon teilweise sehr stark vascularisiert u. in Resorption begriffen. An einzelnen Stellen Einlagerung von Blutpigment. Nur ganz spärlich Epitheloidzellen sichtbar, Riesenzellen lassen sich nicht mehr feststellen. Das umgebende, vom Meerschweinchen stammende Gewebe erscheint nicht gestört. Die Serosa der Bauchwand ist pathologisch nicht verändert. Keine fleckigen Einlagerungen. Leber, Milz u. Nieren von normaler Grösse, Consistenz u. Farbe. Magen u. Darmschlingen reichlich gefüllt, ohne abnormen Befund. Brusthöhle: Lunge zart gelblich-rosa, nirgends verwachsen. Herz von entsprechender Grösse, im Herzbeutel keine vermehrte Flüssigkeit, keine Verwachsungen. Brustspeicheldrüse von normaler Consistenz, Farbe u. Grösse.

Zu den näheren Ausführungen sei einleitend vorweg genommen, dass Boeck zum ersten Male 1899 diesen Krankheitstyp beschrieben hat u. seine Schilderung ist so vorbildlich, dass sie noch heute immer wieder als Schema bei jeder Beschreibung dient, hauptsächlich was die Klinik dieser Erkrankung betrifft.

Beginnen sei mit den **Macroscopischen Erscheinungsformen**, in denen uns diese Hautläsion vor Augen tritt, und da können wir 3 Arten unterscheiden, nämlich:

- 1.) die kleinknotige, disseminierte,
- 2.) die grossknotige, herdförmige u.
- 3.) die diffus infiltrierende Form.

Die erstere nun besteht aus zahlreichen, exanthematösen, in Halbkugelform hervorragenden, papulösen Efflorescenzen, in der Grösse wechselnd zwischen der eines Stecknadelkopfes bis zu der

der Erbse. Daneben können kleine, die Oberfläche nicht überragende, kugelförmige Läsionen auftauchen; dagegen sind seltener lichenoiden, kleinen, einzelnen Efflorescenzen confluierende Herde. Die einzelnen sind von derber Consistenz u. lassen sich leicht als cutane Erytheme palpieren. Im Anfangsstadium, welches *BOECK* als das Stadium der Turgescenz bezeichnet, ist ihre Färbung eine hellrote, nach kurzer Zeit einen mehr lividen oder bräunlichen Ton annehmen. Bei Druck mit dem Glasspatel ergeben sie ein anderes Bild als Lupusherde. Während man bei diesen einzelne Knötchen deutlicher Apfelgelee-Farbe beobachtet, sieht man hier sehr viele gelbliche bis gelblich-bräunliche, feinste Stippchen u. Fleckchen, die meist confluieren u. sich hier u. da als graue oder grau-gelbliche „Staubwölkchen“ zeigen, welche letztere Art geradezu charakteristisch für das B_oeck'sche Sarcoid ist. Im weiteren Verlauf nimmt dann die Hautaffection in der kleinknotigen Form in das Pigmentationsstadium, in dem die gelblichbräunliche Tönung der Oberfläche der sich allmählich zurückbildenden Efflorescenzen noch stärker hervortritt, verbunden mit feinsten Abschilferungen an der Oberfläche, bis das Krankheitsbild sein letztes Stadium, das der Teleangiectasiebildung erreicht, gekennzeichnet durch das Auftreten zahlreicher, erweiterter, kleinster Gefässe im Gebiet der erkrankten Stelle. Dem teleangiectatischen Stadium folgt schliesslich eine spontane Abheilung, entweder mit dem Restzustand eines braunen Pigmentfleckes, der auch nach einiger Zeit wieder spurlos verschwindet, oder einer ganz feinen, glatten Atrophie.

Wie bei jeder anderen Krankheit ist natürlich auch hier eine Abweichung von diesem sonst regelmässigen Ablaufe möglich, abgesehen von einer ev. therapeutischen Beeinflussung, wovon später die Rede sein soll.

Es ist auch nicht selten, dass man alle Stadien nebeneinander findet. Dies ist der Fall, wenn die einzelnen Efflorescenzen in Gruppen von einander getrennten Schüben an verschiedenen Stellen auftreten u. somit die zuerst aufgetauchten, normalen Verlauf voraussetzt, beim Erscheinen späterer Affecte schon das eine oder andere Stadium hinter sich haben.

Um nochmals den spontanen Abheilungsvorgang zu erwähnen, sei bemerkt, dass derselbe das gleiche Endbild bei der grossknotigen, herdförmigen Art, vor allem das der Pigmentierung u. der Teleangiectasiebildung zeigt. Ausgang in Atrophie ist hier aber seltener. Ulceration oder Erweichung wurde nie beobachtet. Der Verlauf ist entsprechend dem andersgearteten der grossknotigen Form auch ein anderer. Wir haben bei dieser von der Cutis ausgehende, grössere oder weniger erhabene Tumoren von runder, ovaler oder unregelmässiger Gestalt, die haselnuss- bis walnussgross werden, sogar darüber hinaus sich ausbreiten können. Ihre Oberfläche ist meist flach, eine Veränderung des Epithels ist im Anfang nicht zu bemerken. Gemeinsam mit der ersten Form ist hier die Farbe u. die allmähliche Umwandlung derselben in der weiteren Entwicklung

des papulösen Exanthems. Doch zeigt sich später eine Differenzierung zwischen Zentrum u. Peripherie. Während diese weiterhin in starke Prominenz behält, feinste Schuppung hat u. auf Glasdruck ein intensiv gelblichbräunlichen Ton mit zahlreichen, kleinsten Fleckchen aufweist, sinkt das Zentrum ein u. nimmt bläuliche Farbe an. Man sieht viele erweiterte, kleinste Gefässe, bis die schon oben erwähnte Abheilung in der einen oder anderen Weise erfolgt.

Wenn wir zur letzten, der diffus infiltrierenden Form kommen, so sei hier vor allem das mit den beiden vorhergehenden gemeinsame Merkmal hervorgehoben. Es sind das wieder die oben beschriebenen gelben Fleckchen, oder, bei näherer Aneinanderdrückung derselben, ein diffus gelblichbräunlicher Ton unter dem Glasspatel. Das Aussehen des Krankheitsherdes selbst ist insofern verschieden, als man hier unscharf begrenzte, anfangs rote, später rotbräunliche oder bläuliche Verfärbung vor sich hat u. ihr entsprechend bei der Palpation der cutane Infiltrate fühlt, die sich nicht deutlich von der Umgebung abheben.

Was das zeitliche Verhältnis dieser 3 Formen zu einander betrifft, so ist zu bemerken, dass die letzte Art ganz selten, eigentlich fast nie allein vorkommt, meist hingegen in Verbindung mit einer der beiden andern. Doch ist es möglich, dass ein u. derselbe Patient Träger aller drei zusammen ist. Einen solchen Fall erwähnt z. B. *ALTMANN*. Sonst findet sich in der benützten Literatur hinsichtlich der Beschreibung des macroscopischen Aspectes dieser Hautläsionen nichts Abweichendes von dem bisher Geschilderten. Es fanden sich immer die erste oder zweite Form oder beide zusammen vor. In allen den Fällen, die klinisch nicht ganz reine Bilder zeigten wie sie das B. S. typisch sind, oder wenn differentialdiagnostisch Zweifel vorlagen, wurde die Diagnose » S. B. « offen gelassen u. bei Discussion resultierte als Ergebnis dann eine Differenz in den Anschauungen.

Vergleichen wir mit dem eben geschilderten typischen Bild des B. schen Sarcoids unseren Krankheitsfall, so lassen sich dabei die Merkmale der ersten u. zweiten Form, feststellen, sodass die Diagnose auf die disseminierte u. herdförmige Form des S. B. unzweifelhaft feststeht.

Neben dem Aussehen der Hautläsionen spielt für die Diagnose die **Localisation** derselben eine grosse Rolle. Wie es für die grosse Mehrzahl der verschiedenen Hautkrankheiten Lieblingsstellen gibt, an denen sie sich zeigen, so ist auch beim B. schen Sarcoid ein atypischer Sitz der Efflorescenzen vorkommen kann. Ganz selten ist natürlich dabei die Möglichkeit, dass die sonst bevorzugten Stellen überhaupt nicht befallen sind, dafür aber eine oder mehrere atypische. Einen solchen Fall haben *PAUTRIER* u. *ELIASCHE* beschrieben, bei dem gerade die charakteristischen Regionen verschont geblieben waren, hingegen ein disseminiertes Miliarlupoid den ganz

apf befallen hatte. Oder es sei der eines 21 jähr. Mädchens erwähnt, gestellt v. *BUSCHKE* in der Sitzung der Berl. Dermatol. Gesellsch. v. 12. 23., bei dem die Efflorescenzen über den ganzen Rumpf verbreitet waren. Häufiger ist die Anordnung, dass gleichzeitig an den Prädispositionsstellen sich befindlichen Affectionen solche auch noch an selteneren sich zeigen. Es würde zu weit führen, alle Fälle anzuführen, bei denen auch die Unterschenkel, Nates u. s. w. ergriffen wurden. Es sind dies verhältnismässig gar nicht wenige. In vielen anderen Autoren haben *WASSILOWA*, *ARNSSON* u. *NETTE* solche beschrieben. Weit mehr verdienen Fälle unserer Presse, die eine ganz seltene, nur vereinzelt bisher beschriebene Localisation zeigen, wie *SPIETHOFF* in einer Sitzung (7. 6. 25) mittelständischer Dermatologen zu Jena einen Fall vorgestellt hat, bei dem B. S. in grossknotiger u. diffus infiltrierender Form auf dem Nasendache localisiert war. Ein Vorkommen auf der Schleimhaut, das Boeck selbst es für möglich hält, stellt z. B. *LEWANDOWSKY* in der Berl. Dermat. Gesellsch. Doch kann B. S. Ansicht gestützt werden durch einen von *WASSILOWA* berichteten Casus einer 29j. Bäuerin, bei der neben Affectionen an den oberen u. unteren Extremitäten solche auch noch an den harten Gaumen bestanden. In einem anderen, von *TAKEYA* getheilten Fall wies die Wangenschleimhaut einer 34 j. Frau erst Rauheit u. Induration auf u. erst nach mehreren Monaten eine Induration an der Nasenwurzel hinzu.

Von Wichtigkeit dürfte es auch sein, was über diesen Punkt über die Bedeutung dieser Krankheit für die Rhino-Laryngologie der Laryngologe *HVIDT*-Kopenhagen sagt. Er betont dabei, bes. mit Rücksicht auf die Differentialdiagnose, dass die Schleimhautaffection die primäre Manifestation dieser Erkrankung sein kann. Er führt einen Fall mit Affection der Nasenschleimhaut, Haut, glandula parotis u. s. w. primalis in histologischer Hinsicht eingehend untersucht u. gefunden, dass eine bestimmte Analogie besteht zwischen dem microscopischen Bilde der Haut u. demjenigen der Schleimhaut, in welchem er dieselben Elemente fand: Haufen von Epitheloidzellen mit Riesenzellen, ohne Necrose u. Zerfall. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Tonsillen das ganze lymphatische System sicherlich die Stellen sind, wo diese Krankheit nicht selten zuerst zum Ausbruche kommt. — Ueberblicken wir nochmals kurz, was über die Localisation des B. schen Sarcoids in der Literatur gesagt wird, so muss die Tatsache zugestanden werden, dass neben dem normalen Sitze an Nacken, Schultern, oberen Extremitäten u. im Gesicht zweifelsohne schliesslich jeder Körperregion vereinzelt Sitz dieser Hauterkrankung sein kann. Sollten wir bei unserem Patienten nach den bisherigen Gesichtspunkten die Diagnose aufrecht erhalten können, so wird sie auch durch die Localisation noch mehr erhärtet. Es kann die später hinzugekommene Affection am Rücken als anormale Localisation sicherlich die Diagnose nicht erschüttern. Der Fall selbst gewinnt durch diese nicht häufig gesehene Localisation gewiss an Interesse.

Wenn bei der Beschreibung der einzelnen Formen des B. schen Miliarlupoids die Rede davon war, dass die Effleroscenen schubweise auftreten, so ist hierüber noch eine weitere Frage zu stellen bezug zu klären, nämlich die, auf welchen Zeitraum sich die einzelnen Schübe erstrecken, damit wir daraus für die ganze Dauer d. B. schen Sarcoids Anhaltspunkte gewinnen können. Ein typisches Beispiel für den Ablauf der Krankheit, der als chronischer bezeichnet werden muss, liefert uns auch der dieser Arbeit zu Grunde liegende Fall. Festgelegt in der Literatur sind Fälle von 1—2 monatlicher Dauer, daneben aber auch fast ebenso häufig solche, bei welcher der Krankheitsprozess durch 5, 6, oder 7 Jahre hindurch sich erstreckt. Als Höchstdauer der Krankheit findet sich in der zur Verfügung stehenden Literatur ein 15-jähriger Krankheitsverlauf bei einer Frau, die *STÜMPKE* der nordwestdeutschen Vereinigung der Dermatologen in Hannover vorführte (Stzg v. 26. 3. 22.) Fast ebenso lang 14 Jahre, bestand die Erkrankung bei einer 41-jähr. Frau, die *TRIMBLE* in Beobachtung hatte. Dieser langsame Ablauf, die häufigen, immer wiederkehrenden Recidive u. die bei einer Localisation im Gesichte vorhandene Entstellung lassen die Erkrankung als lästig bezeichnen. Diese Eigenschaft wird einigermaßen dadurch gemildert, dass das B. schen Sarcoid keine Tendenz zu grösserer Ausbreitung zeigt u. subjectiv, abgesehen von zeitweiligem leichten Juckreiz, keinerlei Beschwerden verursacht. Sogar der schon früher erwähnte Fall von *ALTMANN*, bei dem alle 3 Formen in ausgehntem Masse vorhanden waren, zeigte ein auffallend wenig gestörtes Allgemeinbefinden.

Doch nehmen nicht alle Fälle einen so normalen Verlauf, dass nur die eine oder andere Hautpartie die geschilderten charakteristischen Veränderungen aufweist. So können auch **Complicationen** in anderen Organen auftreten u. da sind es vor allem die Drüsen, die in Mitleidenschaft gezogen werden. Spielen in Symptomencomplex vieler Hauterkrankungen meist die regionäre Drüsengruppen eine wichtige Rolle, so ist es beim B. schen Sarcoid sehr leicht möglich, dass gerade diese frei bleiben, dafür andere, entferntere erkranken. Als besondere Merkwürdigkeit kann das Befallensein von Speicheldrüsen in einem Fall von *BEHRING* angeführt werden. *BRUUSGARD* beobachtete in 5 Fällen dreimalige Vergrösserung der Lymphdrüsen, auch nicht regionärer. *STRANDBERG* stellte bei einer 20-j. Frau mit B. schem Sarcoid Schwellung der retroauriculären Drüsen, Schwellung u. Verhärtung der Parotis u. Mammæ fest. Als wichtig wurde hier festgestellt, dass das histologische Bild der Drüsen genau dem der erkrankten Hautpartie entsprach. Miterkrankung sämtlicher Lymphdrüsen, wobei die tieferen femoralen tauben-ei-gross waren, konnte auch *WEIDMANN* beobachten. Und als letztes Beispiel sei eine leichte Schwellung der submaxillaren u. inguinalen Drüsen bei Localisation der Hautaffection auf beiden Wangen angeführt (*SCHAUMANN*).

Ueber die Zeit des Auftretens der Lymphdrüsencomplicationen in der Literatur die Angaben; es lässt sich deshalb auch kein Schluss ziehen, ob das S. B. die Lymphdrüsenveränderungen bedingt oder ob umgekehrt von den Lymphdrüsen aus eine Verschleppung von Infectionsmaterial die Hauterscheinungen veranlasst. Schwierig ist auch der Beweis zu erbringen, ob Lymphdrüsen u. Hautaffection überhaupt in directer aetiologischer Beziehung miteinander stehen.

Als eine weitere Complication des S. B. sei dann die Iridocyclitis erwähnt, die *BR. BLOCH* in 5 von 20 aus der Literatur zusammengestellten Fällen feststellen konnte. *EHRMANN* konstatierte in einem generalisierten B. schen Sarcoid eine chronische Iridocyclitis. *WEIDMANN* bei einem Neger Keratitis interstitialis u. Iritis. Weitere Fälle lassen sich in der Literatur nicht nachweisen. Ebenso dürfte auch *DARIER's* Anschauung, dass Milzschwellung bei B. ist normalem Blutbilde vorkommen könnte, ziemlich vereinzelt in der Literatur dastehen. *LEWANDOWSKY* beschreibt einen Fall, bei dem neben Schwellung der Lymph- u. Speicheldrüsen auch eine Vergrösserung der Milz aufwies; doch weist er besonders darauf hin, dass die Milzschwellung in diesem Falle nicht mit dem Lupoid in Zusammenhang stand, sondern Folge einer acuten Allgemeinrankung war. Als letzte Complicationen seien die des Knochen- systems erwähnt, welche sich nach *MOROSOFF* in Form von teilweise auftretendem Knochenschwund äussern. Dieselben Veränderungen finden sich in der Literatur auch bei Lupus perniosis erwähnt, den ja *ZIELER* als identisch mit dem B. schen Sarcoid hält. Es seien einige Beispiele angeführt, wie ein Fall von *STAMMANN*, bei dem das Röntgenbild Knochenveränderungen osteo- stischer, osteoplastischer und osteosclerotischer Natur an ver- schiedenen Handknochen zeigte. Ich möchte dann auf *VOLK* hinweisen, der in der Sitzung der Wiener Dermatolog. Gesellschaft (27. I. 21.) einen Fall demonstrierte, welcher Knochenveränderungen im Typus Ostitis cystica tuberculosa an Finger- u. Zehenknochen zeigte, eine, vermutlich tuberculöse, Auftreibung am Sternalrande der 10. Rippe aufwies. *VOLK* ist es auch, der auf Grund gesammelten Röntgenmaterials von B. schen Sarcoid u. Knochenveränderungen diese in ein Schema einreihet u. 2 Hauptarten unterscheidet. Bei der einen bestehen Auftreibungen u. leichte Usuren der Knochen- enden, die entweder zusammen mit Weichteilschwellungen oder unabhängig u. unabhängig von dieser auftreten können. Bei der zweiten Art kommt es an den Händen u. Füßen zur weitmaschigen Resorption eines grossen Theiles oder des ganzen Knochens, sodass ein wabiger Bau entsteht u. die Compacta verschmälert ist. Durch Brüche durch dieselbe hat *VOLK* nie beobachtet. Daneben findet er an Meta- u. epiphysen hirsekorn- bis kirschkern-grosse Höhlräume mit teilweise vollkommen scharf abgesetztem Rande, ohne ausgesprochene Verdickung desselben. Die Gelenke bleiben oft intact. Die Entwicklung ist eine allmähliche, oft unter quälendem

u. bohrendem Schmerz. Bei Ausheilung resultiert nicht selbte Verbildung, aber auch restitutio ad integrum. Diese Knochen veränderungen sind, um es nochmals zu wiederholen, selbst selbte vereinzelte Complicationen dieser an u. für sich seltenen Erkrankung.

Das schon erwähnte Vorkommen ähnlicher pathologische Prozesse beim Lupus pernio lenkt unsere Aufmerksamkeit selbst auf das Gebiet der **Differentialdiagnose**. Dieses würd aber zu einseitig behandelt, wenn wir dabei nicht auch da **histologische** hereinbeziehen würden. Auf letzteres hat Boeck selbst den grössten Wert gelegt u. es als specifisch für die von ihm beschriebene Krankheit bezeichnet. Er hat für seine Anschauung nicht die Zustimmung aller Fachmänner gefunden. Darüber soll weiter unten noch gesprochen werden. Vorerst sei festgelegt, was im microscopischen Bilde als Norm für das benigne Miliarlupus B. anzusprechen ist. Es sind dies cutan gelagerte, scharf umschriebene Epitheloidzellenherde von kreisrunder, ovaler oder strangförmiger Anordnung, die Herde enthalten Epitheloidzellen mit breitem Protoplasma u. Zellen von bindegewebiger Structur. Dazu kommen noch Riesenzellen, von Fall zu Fall in ihrer Anzahl wechselnd; in überwiegend grössten Teile der Fälle dagegen fehlen Lymphocyten Plasma- u. Mastzellen. Die Infiltrate findet man meist im Verlauf von Gefässen, bes. Venen, sodass man an eine (tuberculöse) Phlebitis bzw. Periphlebitis denkt. Nicht selten sind diese Blutgefässe innerhalb der Zellcomplexe gefunden worden. Die Gefässe selbst zeigen meist eine Erweiterung mit freiem Lumen u. ohne Intimawucherung. Somit scheint es sich um einen im perivascularären Lymphraum beginnenden, nach der Umgebung sich ausbreitenden, das umgebende Bindegewebe verdrängenden pathologischen Process zu handeln ohne Necrose im Centrum. Wenn wir uns fragen, ob Boeck in seiner stricten Ansicht recht hat, dass nur bei » seinem « Sarcoid dieser microscopische Befund sich darbietet, so müssen wir mit Nein! antworten; denn auch beim Lupus pernio u. Erythema induratum sehen wir dieselben Epitheloidzellen-complexe, nur dass sie hier mehr in der Subcutis sich finden. Auch ihr Verhältnis zum Gefässverlauf ist ein ähnliches, ebenso wie ihre Formatic die gleiche ist. Ein kleiner Unterschied besteht nur darin, dass die Epitheloidzellen selbst innerhalb der Zellhaufen bei Lupus pernio u. Erythema induratum grösser sind. Aus diesen Gründen sind diese beiden, zum Vergleiche herangezogenen Hauterkrankungen als fast identisch mit dem S. B. bezeichnen. Und nicht einmal einer echten Hauttuberculose, dem Lupus vulgaris, gegenüber lässt sich B. Behauptung aufrecht erhalten. Auch diese Hautaffection kann nach den Erfahrungen LEWANDOWSKY's und KYRLE's ähnlich histologische Bilder zeigen, obwohl hier die Infiltrate meist reichliche Lymphocyten enthalten. Ferner kann die tuberculide Form der Lepros, auf die JADASSOHN als erster aufmerksam gemacht hat, neben dem klinischen Bilde auch histologisch dem Lupus sehr ähnlich sein.

Letzt ist es auch nicht ohne Bedeutung, auf histologisch ähnliche Bilder bei Syphilis hinzuweisen. *GAUS* beispielsweise steht auf dem Standpunkt, dass grundsätzlich der histologische Aufbau Lues, Lepra und Tuberkulose gleichartiger Natur ist. Es ist so beim B.'schen Sarcoid der microscopische Befund, abgesehen vom Lupus pernio und Erythema induratum, sowie Lupus vulgaris sich gegen einen solchen bei Lepra und Lues abzuwerten, was grosse Schwierigkeiten bereitet. Hier muss dann eben bei zweifelhaften Fällen der Bacillennachweis erbracht werden, der bei Lepra nicht selten gelungen ist. Und bei Lues kann man durch histologische Methoden, bei Lupus durch diascopische Untersuchungen die Erkrankung in diagnostischer Hinsicht abgrenzen. Das histologische Bild beim B.'schen Sarcoid ist also nicht spezifisch für diese Erkrankung, kann aber im Verein mit den klinischen Erscheinungen dieser Krankheit die Diagnose wohl befestigen, wie es zweifelsohne in unserem speziellen Falle möglich ist.

Von grossem Interesse u. nicht zu unterschätzender Bedeutung ferner noch die Frage nach der Aetiologie des B.'schen Sarcoids. Bisher konnte in Schnitten der Nachweis von Tuberkelbakterien nicht erbracht werden (mit Ausnahme eines atypischen Falles von *DARIER*); auch andere Methoden zur Ergründung des Zusammenhanges des Miliarlupoids mit Tuberkulose, wie Tierpflanzungen, Tuberculinproben lieferten negative Resultate. Die meisten Patienten boten keinerlei Anhaltspunkte für einen gleichzeitig an anderer Körperstelle vorhandenen tuberculösen Prozess. All das mag vielleicht viele Autoren veranlasst haben, Tuberkulose als Ausgangspunkt der B.'schen Krankheit zu verneinen und nach anderen aetiologischen Momenten zu suchen. Es können für diesen ablehnenden Standpunkt stichgreiflicher Weise Erfahrungen bestimmend sein, wie sie beispielsweise *RUUSGARD* an 5 von ihm beobachteten Fällen gemacht hat; er konnte bei diesen keinerlei Zusammenhang mit Tuberkulose feststellen: das Organ — Tbc., nie Herdreaction auf Tuberkulin, nur negative Tierversuche. Auch *RISCHIN* hält einen causalen Connex zwischen B. u. Tuberkulose für unwahrscheinlich u. glaubt eher an einen spezifischen Erreger. Ebenso hält *ZIELER* das B. S. nicht für tuberculös u. bezeichnet es als eine von der Tuberkulose vollständig zu trennende Hauterkrankung. Nicht wenige Forscher sprechen sich dafür aus, so u. a. *LUZ*, dass die Aetiologie des benignen Miliarlupoids verschiedener Natur sei, dass beispielsweise subcutane Injektionen von Hg., Morphium oder As. durch ihren Reiz auf das umgebende Gewebe die Entstehung eines Sarcoids begünstigen ev. direkt veranlassen. *MICHELSON* beschreibt einen Fall eines B.'schen Sarkoids, das sich auf einer tätowierten Hautstelle (Arm) bildete u. sieht das Irritans der Hautaffection in der eingetätowierten Farbe, worin ihm *OPPENHEIM* zustimmt. Dieser nimmt einen vermittelnden Standpunkt zwischen den vollständigen Verneinern der tuberculösen Aetiologie des Miliarlupoids B. u. deren Antipoden an. Er gibt einerseits die Möglichkeit einer tuberculösen Grundlage

zu, lehnt sie aber auf der Sitzg. der Wiener Dermatolog. Gesellschaft vom 27. 1. 21. als alleinige Ursache ab. Er vertritt die Anschauung, dass Disposition auf Fremdkörper verschiedenster Art — unter die er eben auch die Tuberkelbazillen einreicht — mit Bildung von Sarcoid oder Lupoid antworten können. Man kann aber noch weitergehen bis zu der Möglichkeit, dass Tuberculose u. Fremdkörper gleichzeitig nebeneinander bestehen, u. zwar in der Art u. Weise, dass das Ausschlaggebende, causale Moment die Tuberculose ist. An einer, durch irgendwelche Fremdkörper in Reizzustand versetzten Hautstelle als an einem lokus minoris resistentiae manifestieren sie sich dann in Form eines Lupoids oder Sarkoids. In ähnlicher Weise äussert sich *VOLK*, der beim Miliarlupoid eine, freilich sehr abgeschwächte Form einer allgemeinen Tuberkulose annimmt, bei welcher die Einwirkung irgend einer Noxe zu dem charakteristischen Bilde des S. B. führt, gewissermassen als Ausdruck eines besonderen Reactionstypus solcher Individuen. Er schliesst die Möglichkeit nicht aus, dass diese Reaktionsänderung ev. auch durch andere Ursache, wie Lues bedingt sein kann. Die manchmal unspezifisch positive Wa. R. beim B. schen Sarkoid scheint auf einen allgemeinen Prozess hinzudeuten, bei dem Eiweisskörper und bes. Lipide wesentliche Verschiebungen erleiden.

Nebenbei bemerkt, sind diese Beziehungen zwischen Sarcoid und Aenderung der Zusammensetzung der Blutbestandteile (Toxinell) nach *DE BELLA* nicht ungewöhnlich und wurden bereits von *SCHAUMANN*, *NANTE*, insbesondere aber von *BOSELLINI* und *PAUTRIER* angenommen, welche letztere auf Grund ihrer Erfahrungen zu der Anschauung kamen, dass die Sarcoidtypen von B. und Darier-Rouzy als Hautmanifestationen mit wahrscheinlich multipler Aetiologie (Lues, Tuberkulose) gedeutet werden müssten. Doch neigt *SCHAUMANN* später dazu, den Lupus pernio, den er hinsichtlich der Pathogenese und möglicherweise auch der Aetiologie als mit dem B. S. und dem benignen Lymphogranulom identisch hinstellt, als tuberkulöse Erkrankung anzuerkennen. Er vertritt diesen Standpunkt auch auf dem 5. Kongress der Nord. Dermatolog. Vereinigg. in Stockholm (6.—8. 6. 22.).

Mit der Identifizierung von S. B. und Lupus pernio steht aber *SCHAUMANN* nicht allein; auch *GANS* teilt hierin seine Meinung. Bei einem schon mehrere Jahre bestehenden Falle von Lupus pernio ist ihm der Impfversuch an Meerschweinchen gelungen: 4 Wochen nach der Impfung inguinale Drüsenanschwellungen; bei Tötung des Tieres nach weiteren 3 Wochen tuberkulöse Knötchen in Milz und Leber. In den Ausstrichpräparaten dieser Organe fanden sich Tuberkelbacillen. Klinisch und histologisch war die Diagnose eindeutig. Erwähnenswert waren dabei noch endarteriitische Veränderungen an den Cutisgefässen und Knochenveränderungen, welche einen uncharakteristischen, chronisch-entzündlichen Charakter hatten. *GANS* führt den selten gelingenden Nachweis von Tubercelbazillen auf deren geringe Anzahl im Krankheitsherde, und den meist ne-

ven Ausfall der Tuberculinreaction auf den hohen Antikörpergehalt des Körpers zurück. Neben GANS hält auch MARTENSTEIN B. und Lupus pernio für tuberculöse Erkrankungen und ihre entümlichen klinischen und histologischen Bilder durch eine besondere Reaction des Organismus bedingt. So ist nach seiner Ansicht die negat. Tuberculinprobe auf positive Anergie zurückzuführen, die bei einer Reihe von Fällen auch durch reichlichen Gehalt von Anticutinen erkennbar ist. Nach seiner Anschauung können diese aber auch in der Haut enthalten sein und werden später in das Serum abgegeben. Jedenfalls konnte er Pro- und Anticutine nachweisen, wodurch die tuberculöse Aetologie von Lupus pernio und S. B. eine Stütze gewinnt. MARTENSTEIN hat zur Aufklärung dieser Frage nach der Methode PICKERT und LÖWENSTEIN Versuche gemacht. Diese hatten gefunden, dass das Serum von Tuberculösen, welche gegen hohe Dosen Tuberculin oder Tubercelbacillen-Emulsion unempfindlich sind, nach Vermischen mit Tuberculin die Pirquetsche Reaction abschwächte, während bei 3 Kranken mit S. B. die Reaction verstärkte. Einer Deutung dieser Befunde hat sich MARTENSTEIN bei der geringen Zahl dieser Fälle enthalten.

Vollständige Uebereinstimmung des S. B. mit dem Lupus pernio nimmt ZIELER an; er spricht von der B.'schen Krankheit als dem eigentlichen Lupus pernio. Seiner Ansicht nach stellt dieser eine gleiche Krankheitsbild dar wie die „diffus infiltrierende Form“ des S. B. ZIELER zeigte auf der Versammlung südwestdeutscher Dermatologen in Würzburg (5. — 6. Okt. 24.) 3 Fälle, von denen die Form des Lupus pernio, einer die des S. B. hatte; eine scharfe Trennung war unmöglich. ZIELER wies bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass, wenn auch in der grossen Mehrzahl der Fälle jeder Anhaltspunkt für Beziehungen zur Tuberculose fehle, neuerdings doch einige Fälle beschrieben worden seien, bei denen eine solche vorgelegen habe. So bestanden bei einer 29jähr. Patientin mit S. B. neben typischen Veränderungen an Hand- und Fussknöcheln Vergrösserung der Bronchialdrüsen und Apicitis tuberculosa. Pirquet war anfangs negativ, später schwach positiv. (KASSILOVA.) MARTENSTEIN führte am 28. 5. 24. auf der Tagung der schlesischen Dermatol. Gesellschaft ein Miliarlupoid, bei dessen Träger sich allmählich Beschwerden in der l. Hüfte beim Gehen einstellten, die immer zunahmen. Röntgendurchleuchtung ergab Tuberculose des Femurkopfes. Und in 5 Fällen von bestimmt tuberculöser Erythrocyclitis beobachtete FARANGE BRUYEL ein gleichzeitiges Vorkommen von S. B. und fügt dem hinzu: diese tuberculösen Erythrocyclitiden wiesen auf die gleiche Ursache beim S. B. hin.



Um nochmals auf ZIELER zurückzukommen, so berichtete dieser auf der schon erwähnten Würzburger Tagung über einen weiteren Fall von S. B. ohne besondere Reaction auf Alttuberculin mit normalem Lungenbefund. Als sich einige Jahre später bei dem


gleichen Patienten eine chronische Lungentuberculose entwickelte zeigte sich eine hochgradige Reaction auf A. T. Dabei drängt sich die Frage auf, ob man bei Patienten mit S. B., die einerseits negative Resultate im Tierversuch, negative Tuberculinreaction und negativen Tubercelbacillenbefund im microscop. Schnitt aufweisen andererseits auch sonst keine Stütze für eine vorhandene Tuberculose darbieten, nicht auf andere Weise wenigstens den Verdacht auf Tuberculose begründen könnte. In solchen Fällen kann vielleicht die genaue familiäre wie persönliche Anamnese behilflich sein, die auch bei Organtuberculosen meist von grösster Wichtigkeit ist. So kann früher ein tuberculöser Process vorhanden gewesen sein, der nun abgeheilt ist und als Ausläufer das S. B. zeitigt oder es kann irgendwo im Organismus eine mit keiner Methode feststellbare Tuberculose von noch geringer Ausdehnung bestehen, die sich einzig und allein in Form eines Sarcoids manifestiert; oder es ist das Miliarlupoid ein Prodrom dieser Tuberculose, die dann erst später offen und erkennbar in Erscheinung tritt. Es mag auch in directer Ascendenz Tuberculose vorgelegen haben, die sich dann auf den Nachkommen in einer Widerstandsschwäche gegen Tubercelbacillen vererbte. Wie es ebenfalls nicht ausgeschlossen ist, dass ein Tuberculöser die übrigen Familienmitglieder inficiert und bei diesen sich die Erkrankung erst sehr spät oder vielleicht nur in leichter, unauffälliger Form zeigt. Es lassen sich diese Möglichkeiten sehr wohl mit Beispielen belegen, deren eines eine 23j. Frau mit S. B. ist, die 10 Jahre vor ihrer jetzigen Erkrankung an Drüsentuberculose litt (*ABRAMOWITZ*.) In ähnlicher Weise lässt sich hier ein Fall von *SAVATARD* verwerten, dessen Anamnese 9 Jahre vor der Erkrankung mit Miliarlupoid einen Lupus des Gesichts verzeichnet, der durch Tiefentherapie geheilt wurde. Bei einem Patienten von *SPIETHOF* mit B. S. auf dem Schädeldache begann der Prozess vor 12 Jahren, als der Kranke in einer Lungenheilstätte sich befand. Für die, bei einem B.'schen Sarcoid erst später auftretende Tuberculose soll als Beispiel ein 17 jähr. Dienstmädchen genannt werden, das, nach *MICHALIK*, mit einwandfreier klinischer und histologischer Diagnose eines S. B. in Form von reichlichen, kleinknotigen Efflorescenzen nach 1¹/₂ jährigen Krankenhausaufenthalte starb und dessen Section tuberculöse Halsdrüsen und Lungen ergab. *BUTLER* gibt bei einem 50 jähr. Mann, dessen Erkrankung an B.'schen Sarcoid ein Scrophuloderm nach Halsdrüsenvergrösserung voran ging, in der Familienanamnese an, dass dessen 2 Schwestern an Tuberculose gestorben sind. In ähnlicher Weise führt *ARNDT* in der Berliner Dermatol. Gesellschaft am 12. 6. 23 einen an S. B. Erkrankten vor, dessen Vater ebenfalls der Tuberculose zum Opfer fiel. Es mögen solche Fälle, wenn auch vorsichtig, doch allenfalls zur ev. Klärung des Zusammenhanges zwischen Sarcoid und Tuberculose herangezogen werden. So ist es auch bei der 38 jähr. Patientin, die wegen eines B.'schen Sarcoids in *BIBERSTEIN'S* Beobachtung stand und deren Gatte

ner Lungen und Larynxtuberculose erlag. Bei dem engen Zusammenleben der Ehegatten ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch die Frau von ihres Mannes Krankheit nicht unberührt blieb und zur Zeit ihrer Erkrankung an Lupoid schon den Keim der Tuberculose in sich trug. Auch sollen hierbei nicht jene Fälle vergessen sein, in denen die mit der B.'schen Krankheit Behafteten über die Todesursache ihrer Angehörigen keinerlei Angaben machen können, da sie sich zur Zeit des Ablebens von Eltern oder Geschwistern vielleicht noch im unverständigen Kindesalter befanden. Und dadurch sind möglicherweise noch viele Todesfälle an Tuberculose der schriftlichen Niederlegung in der Vorgeschichte eines S. B. entzogen worden.

Bevor wir zum letzten Abschnitte unserer Abhandlung, der Therapie, übergehen, sei noch kurz der **Prognose** Erwähnung getan. Soweit es sich nicht um Fälle mit Complicationen oder Verschlimmerungen durch ein gleichzeitig bestehendes, anderes Leiden handelt, ist die Prognose durchwegs als günstig zu bezeichnen. Abgesehen von der entstellenden Localisation im Gesichte und der langen Dauer der Krankheit lassen die geringe Ausbreitungstendenz, der Sitz an nicht lebenswichtigen Körperorganen, ihre Neigung zu spontanheilung und nicht zuletzt ihre medicamentöse Beeinflussbarkeit die B.'sche Erkrankung als eine gutartige bezeichnen. Unter den Mitteln, die das B.'sche Miliarlupoid im günstigen Falle beeinflussen, ist in erster Linie das Arsen zu nennen, dem zahlreiche Heilerfolge zu verdanken sind. Von manchen Autoren ist eine Nebenwirkung des Arsen geleugnet bzw. eng begrenzt worden. Aber die Zahl ist gegenüber denen, die gute Resultate damit erzielten, der überwiegenden Minderheit. Es ist ja möglich, dass eine Krankheit auf die gebräuchliche Therapie nicht reagiert. Es sind aber Ausnahmen, die vielleicht in gewissen Eigentümlichkeiten des betreffenden Organismus begründet sind. So zeigte ein von **INNERUD** beschriebener Fall von S. B. in Combination mit gleichzeitigen Sarcoid Darier-Rouzy auf As keine Dauerheilung; ein Patient von **LEVIN** gesundete erst durch Zerstörung der Krankheitsherde durch Endothermie, nachdem alle Heilungsversuche mit As., Tuberculin, Terpentin und Trichloressigsäure gescheitert waren. **FISCHER** berichtete in der Sitzung der Berl. Dermatolog. Gesellschaft v. 13. 3. 23. über eine gegenteilige Wirkung, über Ausbreitung der Affection im Gesichte. Wenn wir aber diesen Misserfolgen die Mittheilungen über raschen Rückgang der Efflorescenzen auf As-Darreichung gegenüberstellen, die weitaus die Regel sind, so dürfte dem Arsen in der Behandlung des B.'schen Sarcoids wohl eine dominierende Rolle zuerkannt werden. In dem Falle **TRANDBERG's**, welcher mit retroauriculärer Drüsenschwellung, Schwellung und Verhärtung der Parotis und Mamae combinirt war, erfolgte auf As.-Verabreichung Rückbildung aller Symptome. **RNDT** sah durch die As.-Therapie den Erkrankungszustand wesentlich gebessert. **BUTLER** beobachtete bei Anwendung des

gleichen Mittels langsame Involution der erkrankten Hautstellen; *KLAUDER* erzielte bei einem 22jähr. Patienten nach 2-monatlicher Darreichung von Sol. Fowleri Heilung. Am deutlichsten zeigte sich die Wirkung sicherlich bei einem von *MICHELL* behandelten Kranken, der regelmässig 3 mal, als die Abgabe von Pilul. Asiatic. ausgesetzt wurde, Recidive bekam, die aber verschwanden, sobald die Kur mit diesem As.-Präparat wieder einsetzte. Doch soll durch diese Wirkung des Arsens nicht eine Restitutionsmöglichkeit der Krankheitsherde durch andere Therapeutica, wie Röntgenbestrahlung, Tuberculin und Salvarsan ausgeschlossen werden. Als Beweise hierfür können dienen: *GROUVEN*'s Erfolg bei einem S. B. mit Alttuberculin und Röntgenbestrahlung; ferner *ROSTENBERG*'s 19jähr. Patientin, die durch Röntgenbestrahlung und Natr. cacodylicum-Einspritzungen von ihrer Krankheit befreit wurde; dann *LESZCZINSKY*'s Vorgehen mit Neosalvarsan und Schwefelzinnober-Salbe, das von Erfolg gekrönt war; und nicht zuletzt die Rückbildung der Erscheinungen durch Salvarsantherapie in einem von *WIRZ* behandelten Falle, wie auch *FALKENSTEIN* Erfolge von Röntgenbestrahlung und Arsen sah. Noch mehr ähnliche Fälle zu bringen würde zu weit führen. Auf eine auffallende Beobachtung bei unserem Falle sei aber ausserdem noch hingewiesen. Am 8. 5. 26. wurde dem Patienten zur histologischen Untersuchung ein kleines Hautstückchen aus einem Krankheitsherd der lk. Schläfe excidiert. Als der Kranke nach 8 Tagen wieder sich vorstellte, ergab sich die merkwürdige Tatsache, dass der Erkrankungsherd, aus dem in der oberen Partie excidiert worden war, nur noch ganz minimal infiltriert war; das Colorit unterschied sich nur noch durch eine leicht braunrote Färbung von der Umgebung. Aehnliche Beobachtungen der Rückbildung bzw. völligen Verschwindens solcher Krankheitsherde nach Probeexcisionen sind auch schon beim Granuloma annulare gemacht worden. Auch bei den Warzen sind ähnliche Vorgänge längst bekannt. Ueber einen derartigen Rückbildungsprocess bei malignen Tumoren berichtet *MÜLLER*, der an 3 Fällen von Beckensarcom, Myxosarcom und einem Enchondrom Aehnliches sah. In der operativen Behandlung war die radicale Entfernung der Tumoren nicht gelungen. Trotz infauster Prognose war nach jahrelanger Beobachtungszeit das Resultat als eine tatsächliche Dauerheilung zu bezeichnen. Den Grund sieht *MÜLLER* in dem einen Falle in dem starken Blutverluste oder in einer Autoinfection durch Eiweisszerfallsproducte, in dem anderen Falle in einer stark einsetzenden Eiterung. *MÜLLER* gibt solche Vorgänge auch bei benignen Geschwülsten zu, wie er sie bei Osteomen und Enchondromen beobachtet hatte. Er glaubt ferner an die Möglichkeit einer dauernden Rückbildung. Es kann somit als feststehende Tatsache gelten, dass sowohl durch mechanische als auch chemische oder entzündliche Noxen Tumoren teilweise oder ausgedehnte Rückbildung erfahren können. Bei der verhältnismässigen Seltenheit dieser Processe verdient in unserem Falle der Rückgang des Infil-





es sowie Farbtonveränderung des betreffenden Krankheitsherdes so mehr unser Interesse. Zum Schluss sei auch noch kurz der spontanen Abheilung der Hautaffecte beim S. B. Erwähnung getan. Es tritt selten wechselt das Verschwinden von Krankheitsherden mit dem Auftreten neuer Nachschübe ab. In der zur Verfügung stehenden Literatur sind sehr viele Fälle beschrieben worden, die ohne jede therapeutische Massnahme spontan abheilten, Sie alle einzeln anführen, würde zuviel Raum beanspruchen. Es sei nur noch die Möglichkeit vermerkt, dass viele Patienten mit leichten Erscheinungen des B.'schen Sarcoids, die eventuell nach kurzer Zeit von selbst abheilten, überhaupt ärztliche Hilfe nicht in Anspruch nahmen, und nur subjektive Beschwerden in den meisten Fällen fehlten oder unbedeutend waren.

C.) ZUSAMMENFASSUNG.

Wenn wir das über das S. B. Gesagte auf unseren speziellen Fall anwenden, so können wir die Diagnose des benignen Miliarsarcoids Boeck wohl stellen. Wir fanden bei unserem Patienten die knotige und herdförmige Form der B.'schen Erkrankung vor. Auch die Localisation der Efflorescenzen ist eine typische, nicht anders als ihr schubweises Auftreten und ihre Recidive. Das Fehlen von Tubercelbacillen im microscopischen Schnitt sowie das negative Resultat des Tierversuches übertragen den Character eines Tuberculids auf unseren Krankheitsfall. Was den Fall über das gewöhnliche Interesse an einem S. B. hinaushebt, ist die Rückbildung des Krankheitsherdes an der l. Schläfe nach der vorgenommenen Exzision und die Hautaffectio am Rücken, die durch ihre, bei dieser Krankheit sonst seltenen Localisation beachtenswert ist. Die häufige spontane Abheilung beim Miliarsarcoid B. bietet der Diagnose am Rücken einen besonderen Beleg.

Das Boecksche Sarcoid selbst haben wir nach dem Gesagten als eine selbständige Krankheit mit typischen, klinischen Bildern aufzufassen. Auch sein Verlauf ist ein charakteristisch, chronischer, bedingt durch das schubweise Auftreten und Verschwinden der Efflorescenzen. Diese können durch ihre häufigen Recidive der Erkrankung oft eine lange Dauer verleihen. Complicationen mit Drüsen und Knochen sind zwar nicht die Norm, können aber den Krankheitszustand verschlimmern. Subjective Beschwerden sind beim Sarcoid meist nur gering. Durch seine geringe Tendenz zu grösserer Ausbreitung ist es als eine Erkrankung benignen Natur zu bezeichnen. Das histologische Bild ist zwar nicht typisch für das S. B. allein, wohl aber im Verein mit den sonstigen klinischen Symptomen für die Diagnose verwertbar. Der meist negative Tierversuch sowie die im microscopischen Schnitt nicht nachgewiesenen Tubercelbacillen mögen eine Eingruppierung unter die Tuberculide wohl befürworten. Da diese Momente aber z. B. beim Erythema induratum in einer Anergie des Körpers und in einer spärlichen Anzahl der Tubercelbacillen im Krankheitsherde

liegen können, so ist es nicht unmöglich, dass die echten Hauttuberculosen aus der Reihe der bisher zu den Tuberculiden gerechneten Hautaffection eine Vermehrung erfahren durch das Sarcoid Boeck. Denn in vielen Fällen liess sich neben dieser Hauterkrankung auch eine anderweitige Tuberculose feststellen. Damit wäre auch hinsichtlich des Lupus pernio die Zugehörigkeit zu den Hauttuberculosen festgelegt. Die bei Lupus pernio wie beim B. schen Sarcoid in ähnlicher Weise vorkommenden Knochencomplicationen sowie die Aehnlichkeit der microscopischen Bilder haben, bes. nach ZIELER, zu einer Identifizierung dieser beiden Krankheiten geführt. Wir dürften nicht fehl gehen, wenn wir **das Sarcoid Boeck identisch mit dem Lupus pernio erklären und es als eine, der Tuberculosen nahestehende Hautaffection von benignem, chronischem Character auffassen.**

Literatur.

- ELER-JACOBI, Lehrbuch und Atlas der Haut- und Geschlechts-
krankheiten. (Berlin 1924).
- ECKE, E., Lehrbuch der Haut und Geschlechtskrankheiten
(Jena 1916).
- WANDOWSKY, F., Die Tuberculose der Haut.
(Berlin 1916).
- ÜHWALD, R., Kurzgefasstes Lehrbuch der Haut und Geschlechts-
krankheiten. (Leipzig 1925).
- RLLE, Histo-biologie der menschlichen Haut u. ihrer Erkrankungen.
(Wien und Berlin 1925).
- NS, O., Histologie der Hautkrankheiten. (Berlin 1925).
- Archiv für Dermatologie und Syphilis. Bd. 147 (Berlin 1924 —
MARTENSTEIN).
- „ „ „ und „ Bd. 138 (Berlin 1922 —
VOLK).
- „ „ „ und „ Bd. 135 (Berlin 1921 —
ALTMANN, LEWANDOWSKY).
- „ „ „ und „ Bd. 131 (Berlin 1921 —
KYRLE).
- „ „ Klinische Chirurgie Bd. 118 (Berlin 1921 —
W. MÜLLER).
- entralblatt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, sowie deren
enzgebiete. Bd. 1 — 18. (Berlin 1921 — 1926).

Lebenslauf.

Ich, Josef Forster, wurde geboren am 7. 3. 93. in Vilsbiburg als Sohn der Bäckermeisterseheleute Josef und Karolina Forster (geb. Lechner). Nach 4-jährigem Volksschulbesuch trat ich 1903 in das humanistische Gymnasium zu Metten ein, das ich 1912 absolvierte. An der Hochschule München studierte ich Medizin vom W. S. 1912/13 bis einschliesslich S. S. 1914, und leistete hierauf vom 1. August 14 bis 31. 12. 18. Militär- und Kriegsdienst sowohl bei der Truppe als auch bei Sanitätsformationen. Nach Besuch eines Kriegskurses im Jahre 1917 in Würzburg legte ich dort die Zwischenprüfung ab. Nach Entlassung aus dem Heeresdienst nahm ich mein Studium wieder auf und beendete es durch das Staatsexamen in München. Von da ab war ich, einige Unterbrechungen von kürzerer Dauer abgesehen — bis 1. Mai 1926 bei verschiedenen pract. Aerzten sowohl in Stadt- als auch in Landpraxis als Assistent bezw. Vertreter tätig.

Zum Schlusse möchte ich mich noch einer ehrenvollen Pflicht erwidern, indem ich dem Leiter der Erlanger Hautklinik, Herrn Prof. Dr. L. Hauck meinen herzlichsten Dank zum Ausdruck bringe, einerseits für die gütigste Überlassung des Themas zu vorliegender Arbeit, andererseits für die wertvollen Hinweise und Ratschläge bei Ausführung derselben.

Nicht minder aufrichtig sei auch mein Dank dem Vorstande des Anatomischen Instituts Erlangen, Herrn Prof. Haselwander gegenüber für seine grosse Mühewaltung und sein liebenswürdigstes Entgegenkommen bei der photographischen Reproduction der microscopischen Bilder.

